

# DORMAX

## REGULADOR DE CRECIMIENTO TIPO 1 LÍQUIDO



### GENERALIDADES:

**Composición:** Cianamida hidrogenada 50.0% p/p

**Registro Sanitario:** RSCO-219/N/23

**Presentaciones:** 20 L, 200 L

### MECANISMO DE ACCIÓN:

**DORMAX** es un regulador de crecimiento tipo 1 que se utiliza para romper la latencia de frutales. Su aplicación promueve el desarrollo de yemas reproductivas brotadas y yemas vegetativas brotadas, contribuyendo a la producción de frutos en las plantas.

### RECOMENDACIONES DE USO

Utilice **DORMAX** de acuerdo con las siguientes instrucciones:

GRUPO	CULTIVOS	DOSIS % v/v	OBSERVACIONES
Frutales	<i>Rosaceae</i> : fresa, zarzamora, mora, manzano, durazno, peral, ciruelo, cerezo, frambuesa, tejocote, membrillo, chabacano, almendro <i>Grossulariaceae</i> : grosella <i>Rutaceae</i> : limón, naranja, mandarina, lima, toronja, pomelo, cidro, tangerina <i>Anacardiaceae</i> : mango <i>Arecaceae</i> : cocotero <i>Bromeliaceae</i> : piña <i>Caricaceae</i> : papaya <i>Euphorbiaceae</i> : yuca <i>Ericaceae</i> : arándano <i>Juglandaceae</i> : nogal <i>Proteaceae</i> : macadamia <i>Lauraceae</i> : aguacate <i>Malvaceae</i> : algodón <i>Sterculiaceae</i> : cacao <i>Musaceae</i> : plátano <i>Myrtaceae</i> : guayaba <i>Oxalidaceae</i> : carámbolo <i>Passifloraceae</i> : maracuyá <i>Rubiaceae</i> : café <i>Sapindaceae</i> : litchi, rambután <i>Vitaceae</i> : vid <i>Moraceae</i> : yaca, higo <i>Zapotaceae</i> : zapote, nispero <i>Lythraceae</i> : granada <i>Oleaceae</i> : olivo <i>Fabaceae</i> : tamarindo <i>Annonaceae</i> : chirimoya, guanábana <i>Agavaceae</i> : henequén <i>Fagaceae</i> : castaño <i>Actinidiaceae</i> : kiwi <i>Betulaceae</i> : avellano <i>Cactaceae</i> : opuntia, pitaya <i>Orchidaceae</i> : vainilla	0.5, 1.0 y 1.5	Realizar una aplicación vía foliar dirigida al dosel de los árboles, una semana después de la defoliación del cultivo.
		1.0, 3.0 y 5.0	Realizar una aplicación vía foliar dirigida a las cañas de las plantas, una semana después de la defoliación del cultivo.
		<i>Vitaceae</i> : vid	2.0, 3.0 y 5.0

### MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes y durante la manipulación del producto, utilice el equipo de protección personal que se describe en el apartado "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta. Verifique que el sello de seguridad no este alterado. Agite perfectamente el envase antes de usar el producto. Abra el envase girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello. La determinación de la dosis debe hacerse con base a los requerimientos del cultivo, análisis de suelo, análisis foliar, equipo de aplicación y forma de aplicación. Mida con una probeta de plástico o algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada del producto mezcle en una cubeta la cantidad de producto a utilizar, agite la mezcla y aplique al cultivo.

AGRICARE S.A. DE C.V.

Acueducto No.2052, Piso 5, interior 39, Colonia Colinas de San Javier, C.P. 44660, Guadalajara, Jalisco, México.

TELÉFONO: (33) 1644 9667.

## CONTRAINDICACIONES

**DORMAX** deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

## FITOTOXICIDAD

**DORMAX**, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

## PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lavar con agua limpia durante 15 minutos, levantando frecuentemente los párpados, si persiste la irritación o se presentan daños oculares, consultar al médico. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua limpia y jabón y dar tratamientos sintomáticos si es necesario, si se presenta irritación, busque atención médica. Ingestión: No inducir al vómito, no dar de tomar nada a una persona inconsciente, acudir inmediatamente al médico. En caso de inhalación: Coloque a la persona intoxicada en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración boca a boca cuando la persona haya tragado el producto o tenga la cara contaminada, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable).

**ATENCIÓN**  
**PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA**



## ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO

Dé tratamiento sintomático.