

AMARRE ULTRA

REGULADOR DE CRECIMIENTO TIPO 2 SUSPENSIÓN CONCENTRADA

GENERALIDADES:

Composición: Paclobutrazol 23.42% p/p
Registro Sanitario: RSCO-149/N/22
Presentaciones: 1 L, 1000 L.

MECANISMO DE ACCIÓN:

AMARRE ULTRA es un Regulador de crecimiento tipo 2 que ayuda en el amarre de los frutos.

RECOMENDACIONES DE USO

Utilice **AMARRE ULTRA** de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Grupo de familias botánicas	DOSIS	OBSERVACIONES
<p>Rosaceae: fresa, frambuesa zarzamora, mora, manzana, tejocote durazno, pera, ciruelo, cerezo, membrillo, chabacano, almendro Grossulariaceae: grosella Rutaceae: limón, naranja, mandarina, lima, toronja, pomelo, tangerina Anacardiaceae: mango Bromeliaceae: piña Caricaceae: papaya Ericaceae: arándano Juglandaceae: nogal Lauraceae: aguacate Malvaceae: cacao Musaceae: plátano Myrtaceae: guayaba Oxalidaceae: carámbolo Passifloraceae: maracuyá Rubiaceae: café Sapindaceae: litchi Vitaceae: vid Moraceae: higo Zapotaceae: zapote, níspero Lythraceae: granada Oleaceae: olivo Fabaceae: tamarindo Annonaceae: chirimoya, guanábana Fagaceae: castaño Actinidiaceae: kiwi Betulaceae: avellano Cactaceae: opuntia, pitaya Orchidaceae: vainilla</p>	<p>2, 3 y 4 mL/metro y diámetro de área foliar</p>	<p>Realizar una aplicación vía foliar al momento de la floración.</p>

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Verifique que el sello de seguridad no esté alterado. Agite perfectamente el envase antes de usar **AMARRE ULTRA**. Para abrir el envase gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, retire cuidadosamente el sello de seguridad colocado en la parte superior del envase, mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada **AMARRE ULTRA**, mezcle en un recipiente adecuado conforme a la cantidad de producto a preparar, agite la mezcla, aplique al cultivo.

CONTRAINDICACIONES

AMARRE ULTRA deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD

AMARRE ULTRA, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: lavar con agua limpia durante 15 minutos, levantando frecuentemente los párpados, si persiste la irritación o se presentan daños oculares, consultar al médico. **Contacto con la piel:** lavar con abundante agua limpia y jabón y dar tratamientos sintomáticos si es necesario. **Ingestión:** lavar la boca con abundante agua, no inducir al vómito, de ser posible realizar un lavado gástrico con carbón activado y acudir inmediatamente al médico. **Inhalación:** mantenga a la persona en reposo y en un lugar bien ventilado y llame al médico. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable).

ATENCIÓN
PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA



ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO

Dé tratamiento sintomático.